



Опыт Казахстана в контроле и управлении латентного туберкулеза: ключевые мероприятия и их мониторинг

Казахстан

Берикова Эльмира

Совещание совместно организованное


Европейским региональным бюро Всемирной организации здравоохранения (ЕРБ ВОЗ),
Европейским центром по контролю и профилактике заболеваний (ЕЦКЗ) и Фондом
противодействия туберкулезу KNCV

31 мая-2 июня 2017 г.


ВОЛЬФХЕЗ - 2017

Эпидемиологическая ситуация по туберкулезу в РК


Основные эпидемиологические показатели ТБ на 100 тыс. нас., 2006-2016 гг.



Общий контингент больных туберкулезом в Национальном регистре РК, абс.ч., 2006-2016 гг



Заболеваемость ТБ у детей и подростков на 100 тыс. нас., 1996-2016 гг.



Перечень лиц, подвергающихся активному обследованию на туберкулеза

Перечень взрослых лиц группы «риска», подлежащий обязательному ежегодному флюорообследованию на туберкулез:

- 1) лица, контактные с больным туберкулезом, независимо от бактериовыделения;
- 2) лица, состоящие на диспансерном учете с хроническими обструктивными заболеваниями легких, сахарным диабетом, алкоголизмом, наркоманиями, ВИЧ/СПИД;
- 3) лица, имеющие остаточные явления в легких любой этиологии;
- 4) лица, употребляющие инъекционные наркотики, злоупотребляющие алкоголем, освобожденные из мест заключения


Перечень детского населения, подлежащий обследованию по пробе Манту 2 ТЕ:

- дети групп «риска»
- дети и подростки из очагов туберкулеза
- дети старше 2 месяцев перед вакцинацией и ревакцинацией.


К группе «риска» по ТБ относятся дети:

- из социально неблагополучных семей (малообеспеченные и многодетные, родители – неработающие, из мест лишения свободы, страдающие алкоголизмом, ЛУИН, ВИЧ-инфицированные, не имеющие постоянного места жительства, мигранты);
- находящиеся на амбулаторном и стационарном лечении с длительным кашлем (более 2 недель) и с симптомами нарастающей интоксикации (субфебрилитет, потливость, снижение аппетита и массы тела, раздражительность, вялость);
- состоящие на диспансерном учете у педиатра по поводу различных заболеваний;
- контингент закрытых учебных заведений (школы-интернаты, специализированные школы для детей инвалидов и малолетних преступников);
- невакцинированные и с неразвившимися поствакцинальными рубчиками БЦЖ;
- получающие иммуносупрессивную терапию.


Охват обследованием Манту и химиопрофилактикой детей из групп риска и контактных с ТБ, охват химиопрофилактикой ЛЖВ



всем детям с виражом и гиперергической реакцией проводится «ДИАСКИНТЕСТ®» (аллерген туберкулезный, состоящий из комплекса рекомбинантных белков ESAT6 - CFP10 для внутрикожного применения в стандартном разведении). Химиопрофилактика назначается детям с положительным результатом «ДИАСКИНТЕСТ®»



Охват ХП лиц, живущих с ВИЧ, 2016



Проблемные вопросы по латентному туберкулезу

- Отсутствие единой политики контроля за латентным туберкулезом
- Раздутый список группы риска, которого не удастся сократить из-за высокого уровня стигмы по туберкулезу со стороны санэпидслужбы и гражданского общества
- Отсутствие эффективных методов диагностики ЛТВ в стране (возможности ограничены пробой Манту и Диаскинтестом)
- Низкий уровень знаний у врачей, включая противотуберкулезных учреждений, по латентному туберкулезу
- Высокий уровень МЛУ ТБ, что ставит под сомнение эффективность ХТ
- Низкая приверженность к химиопрофилактике как со стороны подлежащих, так и медработников
- Химиопрофилактика неконтролируемая.