

Латентная ТБ инфекция

Экспертное и пленарное обсуждение

Piret Viiklepp

Эстония

Рабочие совещания Вольфхезе 2017

Ситуация с ТБ в Республике Эстония:

Эстония входит в состав **18** стран высокого приоритета по ТБ в Европейском регионе ВОЗ

Население – **1,3** млн. человек

Большая политическая и финансовая поддержка борьбы с ТБ
В 2016 г. зарегистрировали **191** случай ТБ (166 новых случаев, 21 рецидив)

Показатели заболеваемости ТБ:

12,6 – новые случаи на 100 000 нас.

14,2 – новые случаи и рецидивы


14,5 – все случаи ТБ на 100 000 нас.

12,0% больных ТБ, протестированных на ВИЧ, имеют сочетанную инфекцию ТБ-ВИЧ (n=22)

- 96, 3% протестированных на ВИЧ

Высокий показатель М/ШЛУ-ТБ

- **12,8 %** впервые диагностированных больных легочным ТБ с положительным результатом посева имеют МЛУ
- **50,0%** ранее леченных случаев имеют МЛУ



Рекомендации в отношении ЛТБИ в национальных руководствах по ТБ 2017 г.

- Лечение ЛТБИ рекомендовано пациентам, начинающим лечение **анти-ФНО** препаратами , пациентам на диализе, готовящимся к трансплантации органов или к гематологической трансплантации
- Лечение ЛТБИ рекомендовано людям, имеющим **близкие контакты** с заразными больными ТБ легких , если :
 - исходный случай имеет лекарственную чувствительность, установлено наличие ЛТБИ, а активный ТБ исключен
 - менее 5 лет
 - с ослабленным иммунитетом
- Лечение ЛТБИ **не рекомендовано** людям, имеющим контакты с больными МЛУ-ТБ. Продолжительность контрольного наблюдения - до 2 лет
- Данные по лечению ЛТБИ собираются в агрегированной форме с 2017 г.

Рекомендации в отношении ЛТБИ в национальных руководствах по ТБ 2017 г.

Сложная задача: ЛТБИ среди людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ)

- ЛТБИ рекомендуется для ЛЖВ, если
- установлен диагноз ЛТБИ, ТБ исключен и
- существует известный контакт с больным ТБ, имеющим сохраненную лекарственную чувствительность.
- Для ВИЧ-инфицированных лиц с подавленным иммунитетом, которые не имели недавних контактов с заразными больными ТБ, лечение ЛТБИ не связано с клинической пользой и **не рекомендовано**.
- **Цель состоит в том, чтобы быстро охватить антиретровирусной терапией всех ЛЖВ** (вне зависимости от числа CD4 +).
- Эстония является страной с высоки бременем **М/ШЛУ-ТБ**
- Эпидемия ВИЧ в Эстонии возникла в начале 2000-х годов с **концентрированной эпидемии среди ПИН** и их сексуальных партнеров.
- В Эстонии врачи-инфекционисты следуют рекомендациям CDC 2015 г. «Рекомендации по профилактике и лечению оппортунистических инфекций у ВИЧ-инфицированных взрослых и подростков» <http://aidsinfo.nih.gov/guidelines> и последним европейским рекомендациям (EACS 2017).