

# Bijzondere 'bijwerking' tijdens profylaxe



FOTO 1.  
INFILTRAAT LINKER ONDERKWAB



FOTO 2.  
VRIJWEL GENORMALISEERD BEELD, 6 WEKEN NA PNEUMONIE

**D**e foto (1) werd gemaakt bij een 25-jarige man, die twee weken eerder gestart was met een behandeling van drie maanden isoniazide en rifampicine vanwege een latente tuberculose-infectie (LTBI). De infectie werd opgespoord (THT 20 mm, IGRA 3,6) tijdens contactonderzoek rondom een vriend met caverneuze longtuberculose. De thoraxfoto was bij aanvang van de preventieve behandeling zonder afwijkingen.

De indexpatiënt had veel transmissie veroorzaakt: een collega had pleuritis tuberculosa en zijn moeder en vijf vrienden – allen uit de eerste ring van 13 personen – hadden een LTBI.

Bij het consult bij de GGD bleek hij al een week gestopt te zijn met de medicatie omdat de klachten door hem geduid werden als bijwerkingen van de medicatie. Zijn klachten bestonden uit

koorts, hoesten en kortademigheid. De thoraxfoto (foto 1) toont een infiltraat in de linker onderkwab en op verdenking van een banale pneumonie (community-acquired pneumonia) werd hiervoor gestart met amoxicilline. Vanwege aanhoudende koorts kwam de patiënt via zijn huisarts nog terecht bij de longarts die het beleid ongewijzigd liet. Na een week waren zijn klachten verdwenen, werd de preventieve behandeling opnieuw gestart en zonder problemen voltooid. ■