



U wilt of kunt geen medicijnen slikken

Als er (medische) redenen zijn om geen medicijnen te gebruiken bespreekt de dokter dit met u. Dan wordt 2 jaar lang elke 6 maanden een foto van uw longen gemaakt. Op de foto kan de dokter zien of u de ziekte tuberculose heeft gekregen. U krijgt een uitnodiging voor de longfoto.

LET OP!

Als u geen medicijnen slikt heeft u meer kans dat u de ziekte tuberculose krijgt. Met de foto's worden de bacteriën niet gedood.



Praktische informatie

Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling tuberculosebestrijding van de GGD. Meer informatie over tuberculose vindt u op de website tuberculose.nl.



Elektronisch patiëntendossier

Bij de afdeling tuberculosebestrijding heeft u een elektronisch patiëntendossier. Elke keer als u een afspraak heeft worden daarin gegevens gezet. In uw patiëntendossier staan persoonsgegevens en medische gegevens. Alle afdelingen tbc-bestrijding van GGD'en in Nederland kunnen het dossier gebruiken. Het dossier is geheim. De GGD mag niets uit het dossier aan anderen vertellen of geven. Dat mag alleen als u dat goed vindt.

Tot slot

Vindt u dat u verkeerd behandeld bent? U kunt bij de GGD een klacht indienen. U kunt terecht bij de afdeling tbc-bestrijding. Op de website van de GGD vindt u hierover meer informatie.

Meer weten? Kijk op tuberculose.nl

Dankzij de steun van de loterijen en haar deelnemers kunnen we er onder andere voor zorgen dat tuberculose in Nederland goed onder controle blijft. Onze dank gaat uit naar de deelnemers van:



In samenwerking met:

Dit is een uitgave van:



WAT IS EEN LATENTE TUBERCULOSE-INFECTIE?



U heeft een tuberculose test gehad. Dat was een huidtest of een bloedtest. Of allebei. De uitslag van de test is positief. Dat betekent dat u tuberculosebacteriën in uw lichaam heeft. Uw longfoto was goed. De bacteriën zijn bij u niet actief. Ze slapen. U bent dus niet ziek. U heeft de ziekte tuberculose niet. U heeft

een latente tuberculose-infectie. U kunt de bacteriën niet aan anderen geven. Ook niet door niezen, hoesten, elkaar een hand geven of zoenen.

Een slapende tuberculosebacterie kan later actief worden. Dan kunt u toch nog ziek worden. Ongeveer 10% van de mensen met een "tuberculose-infectie" krijgt later toch de ziekte tuberculose. De helft krijgt de ziekte in de eerste twee jaar na infectie.

Heeft u een verzwakt afweersysteem door een ziekte zoals hiv of door medicijnen die het afweersysteem verzwakken? Dan loopt u meer kans om de ziekte tuberculose te krijgen.


Ik heb een tuberculose-infectie. De bacteriën in mijn longen slapen, ik voel me ook niet ziek en kan ze op dit moment niet aan anderen overdragen.



LET OP!

Medicijnen voor kanker, reuma of huidziekten kunnen het afweersysteem zwakker maken. Vertel de huisarts of specialist daarom dat u een tuberculose-infectie heeft.

Behandeling van de latente tuberculose-infectie



Wat doet de behandeling?

Een behandeling met medicijnen voorkomt dat u later ziek wordt. De medicijnen maken de "slapende" tuberculosebacteriën dood. De kans dat u tuberculose krijgt wordt heel klein.

Welke medicijnen krijgt ik?

De dokter bespreekt met u welk medicijn u krijgt en hoe lang u de medicijnen moet gebruiken. De meest gebruikte medicijnen zijn isoniazide (INH) en rifampicine (RMP). Vaak zitten die 2 medicijnen in één pil (Rifinah).

Hoe vaak moet ik mijn medicijnen nemen?

De medicijnen neemt u **één keer per dag** in. Neem de medicijnen op een **vast tijdstip** in. Bijvoorbeeld om 8 uur in de ochtend. Dat is belangrijk.



Hoe lang moet ik mijn medicijnen nemen?

De behandeling duurt minstens 3 maanden. Dit hangt af van welke medicijnen u krijgt. U mag de **kuur niet onderbreken** en u moet de **kuur helemaal afmaken**. De bacteriën gaan niet snel dood. Daarom moet u de medicijnen lang gebruiken.




LET OPI

Als u de medicijnen niet goed inneemt of vaak vergeet werkt de behandeling niet. De bacteriën gaan dan niet dood. Let daarom goed op dat u uw medicijnen altijd op hetzelfde tijdstip inneemt en de gehele kuur afmaakt.

Wat moet ik doen als ik mijn medicijnen ben vergeten? Bent u de medicijnen vergeten? Neem ze dan dezelfde dag gewoon in. Komt u er de volgende dag pas achter, neem dan **geen** dubbele dosis in, maar overleg met uw dokter bij uw volgende afspraak.

Mag ik alles eten tijdens mijn behandeling?

Ja, u mag alles eten wat u lekker vindt. Gebruik **geen alcohol** tijdens de behandeling. Samen met de medicijnen is dat slecht voor de lever.



Mag ik andere medicijnen nemen tijdens mijn behandeling?

Vertel altijd aan uw behandelend dokter welke andere medicijnen u slikt. Ook als u anticonceptie (bijvoorbeeld de pil) gebruikt. Door de medicijnen werkt de pil soms minder goed. U kunt dan toch zwanger worden. De dokter bekijkt of de medicijnen samen gebruikt kunnen worden.



Zijn er bijwerkingen van de preventieve behandeling?

Medicijnen kunnen ook bijwerkingen geven. Urine, ontlasting of zweel/traanvocht kunnen rood/oranje worden. De behandelend dokter en/of sociaal verpleegkundige tbc-bestrijding zal u bij controle altijd vragen naar bijwerkingen.



Tuberculose medicijnen kunnen soms ook ernstige bijwerkingen hebben. Heeft u **één of meerdere van de volgende klachten?**

- Huiduitslag
- Misselijkheid
- Buikpijn
- Geelzucht (uw oogwit is dan geel)

Stop met de inname van de medicijnen en neem direct contact op met uw dokter of verpleegkundige tbc-bestrijding. Ook bij twijfels of andere klachten kunt u contact opnemen.